

# Vacuna COVID-19: Acerca de su tercera dosis

## ¡Felicitaciones por haber recibido su tercera dosis de la vacuna contra el COVID!

### ¿Por qué me aplican una tercera dosis?

A medida que conocemos más sobre la vacuna contra el COVID, la evidencia demuestra que su eficacia puede ser menor con el correr del tiempo. Para estar protegido y prevenir una enfermedad severa, la internación o la muerte, algunas personas deben aplicarse una tercera dosis.

En particular, aquellas personas con el sistema inmunitario debilitado (inmunodeprimidas) deberían recibir una tercera dosis. Esto se debe a que dichas personas podrían tener una mejor respuesta con una tercera dosis.

### ¿Deberé aplicarme otra inyección después de esta?

Aún no lo sabemos. Es posible que necesitemos un refuerzo de la vacuna contra el COVID nuevamente más adelante.

### Efectos secundarios:

Algunas personas presentan efectos secundarios después de recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID, pero no hay evidencia de que sean mayores que los efectos posteriores a las dos primeras dosis. Es común que las personas comiencen a sentir malestar aproximadamente 12 horas después de la aplicación de la inyección. Si no se siente bien, le pedimos que se quede en casa. Los efectos secundarios suelen desaparecer en 1 a 2 días.

No es necesario que tome medicamentos como acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Advil) excepto que presente efectos secundarios; en tal caso, está bien que los tome. Si usted trabaja, quizás deba tomarse el día libre después de recibir la tercera dosis. También le recomendamos beber agua en abundancia.

### Efectos secundarios comunes:

- Dolor, enrojecimiento o inflamación en el brazo donde recibió la inyección que puede durar hasta una semana después.
- Fiebre, escalofríos, dolores corporales, dolor de cabeza, náuseas y/o fatiga.

### Si desarrolla efectos secundarios:

- Si le duele el brazo, puede aplicar hielo o una compresa fría.
- Si tiene fiebre, dolores corporales o dolor de cabeza, puede tomar acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Advil), a menos que un proveedor de atención de la salud le haya indicado que no los tome.

### Cuándo llamarnos o buscar atención médica:

Llame a su médico o proveedor de atención de la salud si:

- Los efectos secundarios no mejoran sino que empeoran después de unos días.
- Tiene cualquier otro síntoma preocupante.
- Si tiene repentinamente dolor en el pecho, falta de aire u otros síntomas graves, llame al 9-1-1 o diríjase a la sala de emergencia más cercana.
- You develop chest pain, shortness of breath, or other severe symptoms, please call 9-1-1 or go to your nearest emergency room.