

Preparação para a colonoscopia

Instruções de medicamentos para diabetes

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEUS REMÉDIOS PARA DIABETES

Estas são orientações gerais. Em caso de dúvidas sobre os seus medicamentos para diabetes ou o seu monitoramento, pergunte ao seu prestador de cuidados primários ou endocrinologista. **Não espere até a véspera do exame.**

Verifique a sua glicemia

- Faça testes ao longo de todo o período de preparação
- Verifique antes de tomar líquidos claros e na hora de dormir ou se você apresentar sintomas
- Se a sua glicemia estiver abaixo de 80 mg/dl: consuma de 15 a 20 g de carboidratos
 - o Exemplos de 15 a 20 g de carboidratos: 4 oz (120 ml) de Ensure/Boost límpidos, sucos claros de maçã ou uva branca, gelatina comum adoçada ou picolé de laranja e água
 - o Aguarde de 10 a 15 minutos e teste novamente. Repita se ainda estiver abaixo de 80 mg/dl

Se você toma:	Véspera da colonoscopia:	Dia da colonoscopia:
Medicamentos para diabetes por via oral	Tome metade da sua dose habitual pela manhã NÃO TOME a dose da noite	NÃO TOME antes do procedimento
Medicamentos injetáveis (não insulina) (Byetta, Bydureon, Saxenda, Victoza, Trulicity, Ozempic, Wegovy, Symlin, Mounjaro, Rybelsus, Tanzeum, Zepbound)	No caso dos medicamentos diários, tome a dose habitual (Saxenda, Victoza, Byetta) No caso dos medicamentos semanais (Trulicity, Ozempic, Wegovy, Symlin, Bydureon, Mounjaro, Rybelsus, Tanzeum, Zepbound), NÃO TOME NOS 7 DIAS ANTERIORES AO PROCEDIMENTO	No caso dos medicamentos diários, NÃO tome antes do procedimento (Saxenda, Victoza, Byetta) No caso dos medicamentos semanais (Trulicity, Ozempic, Wegovy, Symlin, Bydureon, Mounjaro, Rybelsus, Tanzeum, Zepbound), NÃO TOME NOS 7 DIAS ANTERIORES AO PROCEDIMENTO

Se você toma:	Véspera da colonoscopia:	Dia da colonoscopia:
Insulinas de ação rápida (Humalog, Novolog, Apidra, Regulares, NPH ou pré-misturadas)	Tome metade da sua dose habitual à noite	NÃO TOME a dose matinal Tome a dose noturna somente se você se alimentar
Insulinas de ação prolongada (Lantus, Levemir, Degludec, Tresiba)	Tome a dose cheia habitual	Tome a dose cheia habitual
Bomba de insulina	Continue sua taxa basal. Se as suas glicemias estiverem consistentemente abaixo de 100, reduza sua taxa basal para 75% da sua taxa habitual*. Só faça bolus de correção para glicemias de 200 ou mais.	Continue sua taxa basal. Se a sua glicemia em jejum for inferior a 130, reduza a sua taxa basal para 75% da sua taxa habitual*. NÃO FAÇA bolus de correção na manhã do procedimento.

*Tire com o seu endocrinologista quaisquer dúvidas sobre como lidar com as definições da sua bomba antes do procedimento