

# Preparación para la colonoscopia

## Instrucciones sobre medicamentos para la diabetes

### INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SUS MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES

Estas son pautas generales. Si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos o el control de la diabetes, consulte a su proveedor de atención primaria o a su endocrinólogo. **No espere hasta el día previo a la prueba.**

#### Controle su glucemia

- Realice pruebas durante el periodo de preparación
- Compruebe antes de ingerir líquidos claros y a la hora de dormir, o si presenta algún síntoma
- Si su azúcar en sangre es inferior a 80 mg/dl: ingiera 15-20 g de carbohidratos
  - Algunos ejemplos de 15-20 g de carbohidratos: 4 oz de Ensure/Boost claro, jugo de manzana, jugo de uva blanca, gelatina endulzada regular o paletas heladas de naranja
  - Espere 10-15 minutos y vuelva a realizar la prueba, repita si sigue por debajo de 80 mg/dl

Si toma:	Día antes de la colonoscopia:	Día de la colonoscopia:
Medicamentos orales para la diabetes	Tome la mitad de la dosis normal en la mañana NO TOME la dosis de la noche	NO TOME antes del procedimiento
Medicamentos inyectables (no insulina) (Byetta, Bydureon, Saxenda, Victoza, Trulicity, Ozempic, Wegovy, Symlin, Mounjaro, Rybelsus, Tanzeum, Zepbound)	Respecto de las dosis de toma diaria, tome su dosis habitual (Saxenda, Victoza, Byetta).  <b>Para las que se toman una vez a la semana (Trulicity, Ozempic, Wegovy, Symlin, Bydureon, Mounjaro, Rybelsus, Tanzeum, Zepbound), NO TOMAR EN LOS 7 DÍAS SIGUIENTES AL PROCEDIMIENTO.</b>	Respecto de las dosis de toma diaria, <b>NO TOMAR antes del procedimiento</b> (Saxenda, Victoza, Byetta)  <b>Para las que se toman una vez a la semana (Trulicity, Ozempic, Wegovy, Symlin, Bydureon, Mounjaro, Rybelsus, Tanzeum, Zepbound), NO TOMAR EN LOS 7 DÍAS SIGUIENTES AL PROCEDIMIENTO.</b>

Si toma:	Día antes de la colonoscopia:	Día de la colonoscopia:
Insulinas de acción rápida (Humalog, Novolog, Apidra, Regular, NPH o premezclados)	Tome la mitad de la dosis habitual en la noche	NO TOME la dosis de la mañana  Tome la dosis de la noche solo si comerá
Insulinas de acción prolongada (Lantus, Levemir, Degludec, Tresiba)	Tome la dosis habitual completa	Tome la dosis habitual completa
Bomba de insulina	Continúe con su tasa basal. Si su nivel de glucosa está constantemente debajo de 100, reduzca la tasa basal habitual un 75 %*. Bolos correctivos para la glucosa de 200 o más, únicamente.	Continúe con su tasa basal. Si su glucosa en ayunas es menor a 130, reduzca la tasa basal habitual un 75 %*. NO HAGA bolos correctivos en la mañana del procedimiento.

\*Consulte a su endocrinólogo sobre cómo ajustar su bomba de insulina antes del procedimiento.