

برنامج الرعاية لمرحلة ما قبل الولادة من الأسبوع 28 لدى CHA



مركز CHA كامبريدج للولادة في مستشفى CHA كامبريدج
شارع كامبريدج 1493
كامبريدج، ماساتشوستس 02139
www.CHAAlliance.org/baby



جدول المحتويات

3	الصفحة	متى ينبغي عليك الاتصال بفريق الرعاية
4	الصفحة	خدمات الدعم والفصول الدراسية
5	الصفحة	الألم الشائعة المصاحبة للحمل
7	الصفحة	الأسئلة المتداولة
9	الصفحة	اللقالات
9	الصفحة	سلامة مقعد السيارة
10	الصفحة	التعرف على المخاض
11	الصفحة	معلومات خاصة بالثالث الثالث
11	الصفحة	الاستعداد لدخول المستشفى
11	الصفحة	الإجراءات الروتينية في قسم التوليد
11	الصفحة	تحفيض ألم الولادة (المخاض)
12	الصفحة	زيارة قسم التوليد
12	الصفحة	التصوير الفوتوغرافي/التصوير بالفيديو لمرحلة المخاض والولادة
13	الصفحة	المقارنة بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية
14	الصفحة	الرضاعة الطبيعية
15	الصفحة	اكتئاب ما بعد الولادة

متى ينبغي عليك الاتصال بفريق الرعاية

يرجى عدم استخدام Mychart للأسئلة أو الاستفسارات التي تتطلب الحصول على إجابة في نفس اليوم.

يمكنك دائمًا الاتصال بمزود الخدمة على مدار 24 ساعة يومياً.
سيقوم أعضاء فريقنا بالإجابة على أي أسئلة هامة تخص حملك والتي لا يمكنها الانتظار حتى ساعات العمل العادلة. كل ما عليك هو الاتصال بالرقم الرئيسي لمركز الرعاية الخاص بك والتتأكد دائمًا من إخبارنا بأنك حامل. وسوف تتلقين مكالمة هاتفية من أحد مزودي الخدمات والذي يمكنه مساعدتك بشأن احتياجاتك الخاصة. إذا لم تلتقي أي اتصالات هنا في غضون 15 دقيقة، فيرجى الاتصال بنا مجدداً.

إذا كنت تعانين من أي من هذه الأعراض، فيرجى الاتصال بعيادتك.

الأسبوع 41-28 (الثلث الثالث حتى موعد الولادة)

اتصل بالعيادة في حالة:

فقدان السوائل (تدفق مياه الجنين أو استمرار التسرب السائل المائي) التزيف المهبلي

انخفاض في حرقة الجنين

علامات الولادة المبكرة (قبل الأسبوع 37) والتي لا تقتصر على:

المغص أو التقلصات المستمرة في البطن

الضغط المستمر على البطن أو الحوض، والذي قد ينتشر إلى الفخذين

ألم/وجع مستمر في أسفل الظهر

أرقام هواتف العيادة

617-665-2229	مركز الولادة في CHA كامبريدج
617-665-2800	مركز CHA لصحة النساء في مستشفى كامبريدج
617-665-3000	مركز CHA للرعاية الصحية الأولية في شرق كامبريدج
781-338-0500	مركز CHA لطب الأسرة في مالدن
781-485-8200	مركز CHA للرعاية الصحية النسائية في ريفير
617-591-4800	مركز CHA لصحة النساء في مستشفى سومرفيل
617-665-3370	مركز CHA يونيون سكوير لصحة الأسرة
617-665-3600	مركز CHA للرعاية الصحية الأولية في شارع وندسور

إذا كنت تتصلين خلال ساعات العمل العادلة، فستقوم ممرضة الفرز بالرد على مكالمتك. يتم الرد على كل المكالمات وفقاً للوضع الطبي العاجل للحالة.



خدمات الدعم والفصول الدراسية

دروس الولادة. إننا نقدم دورسا تعليمية مجانية للولادة في مستشفى CHA كامبريدج باللغة الإنجليزية والبرتغالية. تعقد الفصول الدراسية في أيام الأربعاء في المساء (بالإنجليزية) وفي أيام السبت (بالبرتغالية).

يمكننا مساعدتك في التسجيل في أحد هذه الدورات التعليمية أثناء زيارتك القادمة، أو يمكنك الاتصال بالرقم **617-665-2229** للتسجيل في الفصول المقدمة باللغة البرتغالية اتصلي بالرقم **617-591-4800** للتسجيل في الفصول المقدمة باللغة الإنجليزية.

الرضاعة الطبيعية. إننا نعتبر الرضاعة الطبيعية جزءاً هاماً من صحتك وصحة طفلك في مرحلة ما بعد الولادة (النفاس). يرجى التحدث مع مزود الخدمات بشأن مصادر الرضاعة الطبيعية المتوفرة في CHA.

أوقات مساندة الرضاعة الطبيعية هي:
صباح الثلاثاء 10-12 (مستشار الرضاعة التعاوني) صباح الخميس 12 (مع دعم الداية)

الموقع: 8 شارع كاميليا، كامبريدج. ادخل مباشرة من مدخل مستشفى CHA كامبريدج، الباب المجاور لمركز الولادة في CHA كامبريدج.

اللتقاء بمزودي خدمات آخرين. سواء كان الطبيب أو القابلة من سيقوم بتوليدك، فإننا نوفر اجتماعات مع مزودي الخدمات الآخرين والذين قد يكونون تحت الطلب ومستعدين لإجراء عملية التوليد. هذه الاجتماعات تحدث في المساء كل ثلاثة أشهر، لذا اطلبني في موعدك القادم التحضير لاجتماع. وسوف تكون لديك الفرصة للقيام بجولة في قسم التوليد بعد الاجتماع.

نحن نقدم جولات في طابق الولادة عن طريق تحديد موعد فقط. لتحديد موعد، يرجى الاتصال على الرقم 1374-617-665 من الإثنين إلى الجمعة 7:00 صباحاً - 3:30 مساءً. ستقام الجولات في الطابق الخامس في مستشفى كامبريدج التابع لتحالف كامبريدج الصحي (CHA).

الآلام الشائعة المصاحبة للحمل

إن الحمل سبب في كل أنواع التغييرات التي تحدث في جسمك، وبعضها قد يسبب عدم الشعور بالراحة.

التغييرات في نمط الحياة والأدوية المتناهية دون وصفة طبية يمكنها أن تساعد في علاج بعض الأعراض التي تعانين منها خلال فترة حملك. إذا لم يتم القضاء على الأعراض التي تعانين منها، أو إذا كانت لديك المزيد من الأسئلة، فيرجى الاتصال بالعيادة والتحدث مع الممرضة أو مزود الخدمة. إليك بعض الاقتراحات الأساسية والتي سوف تساعدك في حل المشاكل الشائعة.

الوجع والآلام. يمكنك لبطنك الذي ينموا أن يحدث تغييراً من طريقة وقوفك والذي يؤدي إلى الشعور بآلام في الظهر. كما يمكن أن تشعر بآلام في الورك والوحوض بسبب الهرمونات التي تعمل على تحرير المفاصل والأنسجة. لمنع آلام الظهر، حاولي الحفاظ على الوقوف باستقامة وارتديء الأحذية ذات الكعب المنخفض وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة من الوقت. كما أن الحصول على قسط من الراحة والتسلیک والكمادات وتناول الأسپيتامینوفين (Tylenol) سوف يساعد على الأرجح. أثناء النوم، يمكنك وضع وسادة بين ركبتيك وتحت بطنك لدعم ظهرك ومفاصلك.

الصداع. الشعور الصداع البسيط أمر شائع في جميع مراحل الحمل. الراحة وشرب السوائل والحد من التوتر الأسپيتامینوفين (Tylenol) كلها أمر ستساعد في تخفيفه. إذا لم تنجح أي من هذه الطرق أو في حالة شعرت بصداع مفاجئ أو شديد، فيرجى الاتصال بالعيادة.

الشد العضلي. تعاني العديد من النساء من الشد العضلي، خصوصاً في الليل، في الثالث الثاني والثالث من فترة الحمل. في كثير من الأحيان، كل ما عليك هو شد أصابعك باتجاه ركبتيك أو المشي وهذا يساعد في تخفيف الشد العضلي. يرجى إخبارنا إذا كنت تعانين من رخواة أو احمرار في أي منطقة معينة.

التورم. يمكنك التخلص من تورم الأطراف السفلية عن طريق رفع قدميك عدة مرات كل يوم أو الاستلقاء على جانبك الأيسر. ويمكن أن يحدث التورم أيضاً في اليدين، وخصوصاً في الصباح، لذا يجب عدم ارتداء الخواتم إذا لاحظت ذلك. يرجى الاتصال بنا إذا كنت تعانين من تورم مفاجئ وخصوصاً في الوجه واليدين.

الإمساك والبواسير. تعاني العديد من النساء من الإمساك بسبب تركيب الهرمونات في الجسم والفيتامينات المكملة والتغييرات التي تحدث لجسمك. لذا فإن ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة وزيادة تناول السوائل واتباع نظام غذائي يحتوي على الألياف هي بمثابة أول الخطوات الكبيرة في المحافظة على حركة الأمعاء. كما أن هناك خيارات أخرى تتمثل في أدوية مثل: Miralax و Colace.

يمكن أن تتطور حالة البواسير (توسيع أوردة الشرج) لدى العديد من النساء أيضا. حيث أن الحكة الشرجية والحرقان والشعور بالألم أثناء تحرك الأمعاء وبقع الدم عند مسح المنطقة هي من الأعراض الشائعة للبواسير. لذا فإن منع البواسير يساعد غالباً في حل هذه المشكلة، إلا أن كريم Anusol والحفاظات القطنية (تعمل على تبريدها!) وهي أيضاً خيارات جيدة.

حموضة المعدة. التغييرات الهرمونية أثناء فترة الحمل تبطئ من عملية الهضم وتترخي عضلات البلع. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالضغط والحموضة في الصدر. كما أن تغييرات نمط الحياة مثل: الأكل قبل 3-2 ساعات قبل النوم ورفع الجزء العلوي من جسمك إلى أعلى أثناء الاستلقاء وتجنب الأطعمة الحارة والدهنية يمكنها أن تساعد. إضافة إلى أنه يمكن استخدام كميات قليلة من مضادات الحموضة الخفيفة مثل: Gelucil و Mylanta و Tums.

تحثى مع مزود خدمات ما قبل الولادة في حالة أن هذه النصائح لم تساعدك.

الإفرازات المهبلية. الزيادة في الإفرازات المهبلية الدهنية ذات اللون الأبيض عادة ما تكون أمر شائع خلال فترة الحمل. النظافة الجيدة والغسل الخارجي بشكل منتظم باستخدام الصابون اللطيف وارتداء الملابس الداخلية القطنية مع عدم استخدام الدش المهيلي. إذا كنت تعانين من حكة في المهبل أو إفرازات ملونة أو ذات رائحة، فيرجى الاتصال بعيادة ما قبل الولادة.

الإجهاد/النوم. التغييرات المادية في جسمك التي تحدث خلال فترة الحمل يمكنها أن تكون مرهقة وتؤثر على قدرتك على النوم. خذ قيلولة أثناء النهار كلما كان بإمكانك ذلك. من الشائع أن تكوني بحاجة إلى التبول عدة مرات أثناء الليل. لنقليل هذا الأمر، حاولي تناول معظم السوائل التي تحتاجينها في وقت مبكر من اليوم. كما أن تقليل الكافيين من القهوة ومعظم أنواع الشاي والمشروبات الغازية يمكنه أن يساعد أيضا. مارسي عادات النظافة الإيجابية قبل النوم (خذي حمام دافئ قبل النوم وأحصل على تدليك لعضلاتك ومارسي الأنشطة الهدئة مثل القراءة)، وضعِي الوسائد خلف ظهرك أو تحت بطئك وبين ساقيك للتمتع براحة أكثر.

هل توجد أدوية يمكنها أن تساعد؟ إذا كانت هذه الاقتراحات لا تساعد في تخفيف الأعراض التي تشعرين بها، فيرجى التحدث مع مزود خدمات ما قبل الولادة ومناقشة الحلول الأخرى. يرجى الحذر من المنتجات التي توصف بأنها "طبيعية" أو "عشبية" حيث أن الكثير منها لم يتم فحصه لمعرفة ما إذا كان تناولها أثناء فترة الحمل آمنا.

الأسئلة المتداولة

للمعزم أجزاء الجسم، يمكنك مواصلة معظم الأنشطة التي تقومين بها يوميا طوال فترة حملك.

إلا أن الممارسات مثل: التدخين والتدخين السليبي وتناول المشروبات الكحولية وتناول الأدوية دون وصفة طبية وبعض الأدوية لا تعتبر آمنة لك أو لحملك. حيث أن هذه الممارسات يمكن أن تعرشك أنت وحملك والطفل لمضاعفات صحية خطيرة. يرجى استشارة مزود خدمات ما قبل الولادة إذا كانت لديك أي أسئلة.

فيما يلي بعض الأسئلة المتداولة وإجابتها.

لا تتردد في طرح الأسئلة على فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أسئلة غير منكورة هنا!

ما الذي يجب أن أفعله في حالة شعرت بالقلق بشأن حركة الطفل؟

في الثالث الثالث، من المهم أن تشعري بحركة طفلك بانتظام كل يوم. إذا يساورك القلق بشأن عدم شعورك بحركة الطفل بشكل طبيعي، فيرجى تناولوجبة خفيفة أو شرب كوب من العصير ثم اجلسي بهدوء أو استلقي على جانبك الأيسر. وقومي بعد عدد حركات الطفل التي تشعرين بها. من المرجح أن تشعري بـ 10 حركات في غضون ساعتين. إذا أحست بـ 10 حركات في وقت أقل، فلن تكوني بحاجة إلى متابعة المدة المتبقية من الساعتين. أما إذا لم تشعري بـ 10 حركات في ساعتين، أو كنت ما تزالين تشعرين بالقلق، فيرجى الاتصال بعيادتك (أرقام هواتف العيادة مدرجة في الصفحة رقم 2 من هذا الكتاب).

ما هي التوصيات بشأن مصاصات الطفل؟

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالانتظار حتى الشهر الأول قبل استخدام المصاصات للأطفال حديثي الولادة. وإذا كنت تستخدمين واحدة، فإننا نوصي باستخدامها فقط عند وضع رضيعك من أجل النوم. لا تجبري الطفل على أخذها ولا تستبدليها عندما يغفو الطفل.

علماً أن التوقف عن استخدام المصاصة في الشهر السادس من عمر الطفل سوف يساعد على منع الطفل من التعلق بها على المدى الطويل. وتأكد من تنظيف المصاصة باستمرار واستبدالها حسب الحاجة.

هل يمكنني ممارسة الجماع أثناء الحمل؟

ممارسة الجماع أثناء الحمل أمر آمن، ما لم يطلب منك مزود خدمات ما قبل الولادة بالتوقف عن الممارسة. وقد ترغبين في التأكد من استخدام الواقي الذكري للوقاية من الأمراض المنقلة جنسيا.



هل يجب أن أتجنب أشياء مثل: الرسم بالأصباغ أو العناية بالشعر أو المانيكير/الباديكيير؟

تعتبر دهانات اللاتكس المائية مقبولة عموماً كما أن الأبخرة المتطرفة عنها لا تعتبر سامة إذا كنت في مكان جيد التهوية. العناية بالأظافر مقبولة، لكن يجب أن تتأكد من فتح النوافذ أو تشغيل المروحة حتى في الأماكن جيدة التهوية. يتفق العديد من مزودي الخدمات على أن العناية بالشعر قد لا تشكل خطاً على وضع الجنين، وبالتالي فإن العناية بالشعر تعتبر خياراً شخصياً أثناء فترة الحمل.

للسئلة الخاصة بالأعراض المصاحبة للحمل، يرجى الاتصال بالخط الساخن على الرقم: 1-800-322-5014.

هل صحيح أنني لا يجب أن أقوم بتنظيف مخلفات القطط؟

نعم - يمكن لتغير قمامه القطط أن يعرضك لمرض يسمى داء المقوسات والذي قد تحمله بعض القطط. وفي حين أنه في العادة يسبب عدوى خطيرة، إلا أنه في فترة الحمل يمكن أن يؤثر على نمو دماغ وعيني الطفل. لذا فإننا ننصح بالاستعانة بشخص آخر لتنظيف مخلفات القطط، لكن إن كان عليك القيام بذلك، فيرجى استخدام قناع (يغطي أنفك وفكك) واستخدام قفازات - وغسل يديك مباشرة بعد التنظيف.

هل السفر آمن؟

بشكل عام، يعتبر السفر آمناً حتى الأسبوع 36 في الحمل الطبيعي، ما لم يخبرك مزود خدمات ما قبل الولادة بخلاف ذلك. وسواء كان السفر بالطائرة* أو القطار أو السيارة، فإنه يجب عليك تناول الكثير من السوائل والتتأكد من النهوض والمشي كل نصف ساعة إلى ساعة لتمديد ساقيك وتجنُّب التجلطات الدموية. وفي السيارة، تأكدي دائماً من ارتداء حزام الأمان، وتأكدي من وضع الحزام الحاضن أسفل بطنك لأنها تنمو. ويجب عليك التأكد من عملة خاصة الوسائل الهوائية.

*قد يكون لبعض شركات الطيران قيوداً خاصة، لذا فإنه من الأفضل دائمًا التأكد من شركة الطيران قبل التخطيط للسفر.

*يرجى استشارة مزود الخدمات الخاص بك بشأن وجهة السفر التي تنوين السفر إليها.

هل يحتمل أن يكون جسمي دافناً جداً أثناء الحمل؟

نعم. في الأيام الحارة أو بعد ممارسة الأنشطة، خذ قسطاً من الراحة وأريحي جسمك، واسرّبي الكثير من الماء. لا تستخدمي الجاكوزي أو حوض الاستحمام الساخن أثناء الحمل، حيث أنها قد ترفع حرارة الجسم إلى مستويات غير آمنة. الحمام الدافئ لا يُؤْسَب به، طالما لم تتجاوز حرارة المياه أكثر من 100°F.

هل يمكنني الاستمرار في الأعمال الروتينية المتعلقة بالأسنان؟

نعم. تنظيف الأسنان بشكل روتيني أثناء الحمل أمر جيد. أما فيما يتعلق بالأمور الأكثر من ذلك، فإن طبيب الأسنان هو من يجب عليه اتخاذ القرار بشأن المخاطر/الفوائد المتعلقة بالرعاية أثناء الحمل. ولا ينبغي استخدام التخدير العام أو الموضعى. يمكن القيام بالتصوير بالأشعة السينية إذا اقتضت الضرورة، ويجب تغطية وحماية المرضى بشكل مناسب. إذا كان هناك أي سؤال حول أمان الأدوية أثناء فترة الحمل، فيمكن لطبيب الأسنان الخاص بك أن يتصل بالعيادة.

اللقالات

إننا نوصي بأخذ بعض اللقالات أثناء الحمل وإعطائهما للأطفال حديثي الولادة. فيما يلي بعض المعلومات المفيدة.

لقال تDAP (التيتانوس والديفتريا والسعال الديكي)

السعال الديكي (شهقة السعال الديكي) هو مرض شديد العدوى ويحتمل أن يسبب الوفاة لأي طفل دون 12 شهرا. الإصابة بالسعال الديكي شائعة هذه الأيام بعكس ما كان سابقا. تفيد تقارير منظمة الصحة العامة أنه عندما تحصل النساء على لقال Tdap في الثلث الثالث من الحمل (بغض النظر عن متى كانت آخر مرة أخذته)، فإنه يعمل على حمايتهن وكذلك على تمرير الأجسام المضادة إلى أطفالهن، مما يساعد على حماية الرضيع في الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة. بالإضافة إلى ذلك، فقد وجد الباحثون أن في أكثر من 80% من حالات الإصابة بالسعال الديكي، فإن الأطفال الرضع قد حملوا المرض من أحد أفراد الأسرة. ولهذا السبب، فإن منظمة الصحة العامة توصي بإعطاء لقال Tdap لكل شخص قريب من الأطفال الرضع.

لقال التهاب الكبد الوبائي B للطفل

بينما لا يحتاج الأطفال معظم اللقالات إلا بعد الأسبوع 8-6، إلا أن الخبراء ينصحون بإعطاء لقال التهاب الكبد الوبائي B لكل الأطفال حديثي الولادة في أقرب وقت من ولادتهم. فيروس التهاب الكبد الوبائي B هو عبارة عن فيروس ينتشر بين الناس (عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو بسوائل الجسم) ويسبب تلف الكبد. علما بأن الكبد تساعد الجسم في مكافحة الالتهابات والسيطرة على التزيف وتصفية الأدوية وغيرها من السموم من الجسم وتخزين الطاقة. الأضرار الناجمة عن التهاب الكبد الوبائي B يمكن أن تمنع كل هذه الوظائف الهامة، ويمكنها أيضاً أن تتسبب في فشل وسرطان الكبد. ولحسن الحظ، فإن هناك لقال يمكنه أن يمنع الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي B لجميع الأعمار. الحصول على هذا اللقال في أقرب وقت بعد الولادة يحمي طفلك. ينقسم اللقال إلى 3 جرعات، تكون الجرعة الثانية في الشهر الثاني، والجرعة الثالثة في الشهر السادس. تشير الأبحاث إلى أن هذا اللقال آمن جداً للرضيع والأطفال والبالغين. الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً هي الوجع في مكان حقن الإبرة وحمى خفيفة إلى معتدلة. وهناك فرصة ضئيلة جداً للإصابة بالحساسية، كما هو الحال في جميع اللقالات. يرجى طرح أي سؤال على مزود خدمات ما قبل الولادة.

سلامة مقعد السيارة

يتطلب قانون ولاية ماساتشوستس أن يتم استخدام الكراسي المخصصة للأطفال الذين لم يتجاوزوا سن 12 عاماً في المركبات الخاصة. هذه الحزمة تتضمن كتيباً يوضح الأنواع المختلفة للمقاعد المتناثة.

يجب أن يوضع الرضع في المقعد المخصص لهم وأن يوضع المقعد في وسط مقعد السيارة الخلفي لتجنب الوسائل الهوائية. ومن الأفضل أن تقوم بتأمين قاعدة المقعد في السيارة قبل مغادرة المستشفى. لا يسمح للعاملين في المستشفى بمساعدتك في وضع مقعد الأطفال في السيارة.

لمزيد من المعلومات حول التركيب والسلامة، فإنه يمكنك الاتصال بشرطة ولاية ماساتشوستس أو الشرطة المحلية أو قسم الدفاع المدني.

كما أن المواقع الإلكترونية التالية تحتوي أيضاً على معلومات مفيدة:

- الإدارية الوطنية للسلامة المرورية – www.seatcheck.org أو www.nhtsa.gov
- الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال – www.aap.org

التعرف على المخاض

تحدث الانقباضات عندما تبدأ عضلات الرحم في الشد، وهي تساعد الطفل على إخراجه أثناء الولادة الطبيعية. من المهم تمييز الانقباضات وصولاً لمرحلة المخاض عن (انقباضات براكتون هيكس) التي تحدث في منتصف فترة الحمل أو قبله.

من المرجح أن تشعرني بانقباضات مبدئية في الحالات التالية:

- إذا كانت الانقباضات غير منتظمة أو ضعيفة أو كنت تشعرين بها في جزء واحد من بطنك
- المشي أو تغيير الوضعية أو شرب السوائل يمكن أن تعلم على إخفائها

قد تكونين دخلت مرحلة المخاض في الحالات التالية:

- إذا كانت الانقباضات تزداد بشكل مكثف أكثر (تدوم لمدة 30-70 ثانية)، وتحدث على فترات غير منتظمة، وتشعررين بها في كل بطنك وربما ظهر لك
- إذا لاحظت إفرازات مهبليّة مصحوبة ببعض الدم.
- إذا كانت هناك اندفعات مائية (يمكن أن تكون عبارة عن تدفقات كبيرة أو مستمرة من سائل شفاف عديم الرائحة)

كيف تحسبين وقت الانقباضات (يرجى استخدام كلتا الطريقتين):

- الزمن: من بداية إلى نهاية كل انقباض

• التكرار: من بداية الانقباض الأول إلى بداية الانقباض التالي

اتصللي بالعيادة أو رقم الطوارئ فوراً في حالة:

- إذا كان لديك تدفقات مهبليّة كبيرة أو ثابتة من السائل الشفاف (مع أو بلا انقباضات)
- إذا كان لديك نزيف مهبلي
- إذا كانت الانقباضات تحدث كل 5 دقائق، إذا كان هذا هو طفلك الأول، أو كل 10 دقائق إذا لم يكن طفلك الأول
- إذا شعرت بألم مستمر في البطن أو أسفل الظهر لأول مرة
- إذا لم يكن الطفل يتحرك بالشكل الطبيعي
- إذا كنت في الأسبوع 37 و كنت تعانيين من آلام/ضغط في البطن أو الحوض أو الإسهال أو زيادة في الإفرازات المهبليّة، إضافة إلى الأعراض المذكورة أعلاه

يرجى أيضاً الاتصال بالعيادة أو رقم الطوارئ إذا كانت لديك الأعراض التالية. هذه الأعراض ليس لها علاقة بالمخاض:

- صداع مستمر

• تغيير في حاسة البصر

• تورم مفاجئ في الوجه أو اليدين

• ألم تحت الثدي الأيمن

هذه ليست عبارة عن القائمة الكاملة للأعراض، لذا يرجى الاتصال بالعيادة إذا كانت لديك أي مخاوف!

سات خاصة بالثلث الثالث

داد لدخول المستشفى

من النساء على وشك الولادة يسألن عما يجب إحضاره معهن إلى المستشفى.

ائمة قصيرة بالاقتراحات:

باشب وجوارب وملابس مريحة و/or روب

لابس بديلة لك ولطفلك، وكذلك مجموعة من الملابس الداخلية وحملات الصدر (حملات الصدر المخصصة
رضاعة)

اميرا/هاتف (مع بطاريات إضافية أو شاحن)

شرطة موسيقية يمكنها أن تساعدك على الاسترخاء وكتب

ائمة بجهات الاتصال ليتم التواصل معهم وإخبارهم بالمستجدات

وأطارات التجميل، بما في ذلك: التوك والمشابك وفرشاة ومرطب الشفاه وفرشاة/معجون الأسنان

موال نقدية، على الأقل 20 دولارا ذات صفات صغيرة/فكة، لشراء الوجبات الخفيفة والهدايا وغيرها من الحاجيات

قدع الطفل المخصص للسيارة لنقل الطفل إلى المنزل إذا كنت تتبعين قيادة السيارة أو الانتقال بسيارة أجرة للعودة إلى المنزل

ءات الروتينية في قسم التوليد

خر بالرعاية التي نقدمها للأمهات والأطفال حديثي الولادة. جزء من هذه الرعاية يستخدم بعض الأنشطة لتعزيز
لـ بين الأم والطفل وإطعام الرضع.

عدات المخاض والتوليد وما بعد الولادة، يتم عمل الأشياء التالية:

ترابط بالجلد مع طفلك منذ ولادته وحتى انتقالك للمنزل. وهذا يقلل من بكاء الطفل ويبقيه دافئاً ويزيد من التقارب
بين الأم والطفل.

رعاية بالتهويدي/بقاء المولد مع الأم، حتى تتمكنى من التعرف على طفلك من البداية. يمكن القيام بالعديد من
لأنشطة الروتينية أثناء بقاء الطفل في غرفتك، بدلاً من وضعه في الحضانة.

حقن: سيتم إعطاء فيتامين K ومصل التهاب الكبد الوبائي B.

صاصات الأطفال للتعرف عليها فقط، بما أنه لا ينصح باستخدام المصاصات في الأسابيع الأولى بعد الولادة. إذا
ررت استخدام المصاصة، فسوف تحتاجين إلى إحضار واحدة.

، ألم الولادة (المخاض)

أولاده، تعاني العائلات من أوقات مثيرة ومقلقة. كما تعتبر مسألة مواجهة ألم الولادة من أكثر ما يقلق النساء. إليك
المعلومات التي يمكنها مساعدتك في تخفيف الآلام أثناء المخاض. يرجى عدم التردد في مناقشة هذه المعلومات مع
الخدمات في أي وقت خلال فترة الحمل.

خاء والتنفس بهدوء هما تقنيات مفيدة لتفادي الألم. كما أن دروس الولادة مفيدة في تعليمك هذه الأساليب، فضلاً عن
لدور فهمك العام عن الولادة. كلما كان لديك معلومات أكثر، كلما كنت أكثر استرخاء أثناء فترة المخاض.

ات الأولى لتخفيف الألم يمكن أن تشمل على: المشي أو تغيير وضعية الجسم أوأخذ حمام ساخن أو دافئ أو وضع
الساخنة على ظهرك إذا كانت الولادة متعبة.

في مرحلة المخاض النشطة، يمكن تخفيف الألم باستخدام الأدوية. هناك نوعان مختلفان من الأدوية:

1 مسكنات الألم. هذه الأدوية تساعد في تخفيف الألم، إلا أنها لا توقف الانقباضات. وعادة ما يتم إعطاؤها عن طريق الحقن الوريدي. أما بالنسبة الآثار الجانبية، فإنها قد تسبب النعاس لك وللطفل. وعادة ما تدوم هذه الآثار لوقت قصير فقط.

2 التخدير. تشمل هذه الأدوية على خيارات مثل: التخدير حول الجافية أو التخدير العام. يتم إعطاء التخدير فوق الجافية لحوالي 50% من النساء أثناء إحدى مراحل المخاض. يسبب التخدير فوق الجافية فقدان الإحساس بالنصف السفلي من الجسم ويسكن الألم الناجم عن الانقباضات. غالباً ليس له أي أثر على الطفل.

زيارة قسم التوليد

- **المخاض والولادة.** يمكن لشخص واحد فقط مرفاقك في منطقة الفرز. وبمجرد الانتقال إلى غرفة الولادة، فإنه سوف يسمح لك باختيار الأشخاص الذين توبيخ منهم مساندتك أثناء الولادة وسوف يمكنون صلاحية الدخول إلى غرفتك متى شاءوا. يسمح لأخوة الطفل بالزيارة، لكن يجب أن يرافقهم شخص بالغ في جميع الأوقات. قد يكون عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في غرفتك في نفس الوقت مقصوراً على فريق الرعاية الصحية، وذلك اعتماداً على ما قد يحدث في ذلك الوقت.
- **بعد الولادة.** يسمح لشريكك وأطفالك وأجداد الطفل بالزيارة على مدار 24 ساعة في اليوم. بالنسبة للزوار الآخرين، فإن ساعات الزيارة هي من 12-8 مساءً. ولا يسمح ببقاء الأطفال طوال الليل، ويجب أن يكونوا برفقة شخص بالغ طوال الوقت.
- **المرض.** إذا كان أحد أصدقائك/أفراد عائلتك يعني من أحد الظروف الصحية التالية، فإنه لا يسمح لهم بالزيارة: مرض السل النشط أو حالة تنفسية حادة أو حمى أو مصاب بأمراض معدية أو الحصبة.

التصوير الفوتوغرافي/التصوير بالفيديو لمرحلة المخاض والولادة. يسمح بالتصوير الفوتوغرافي في حالة الولادة الطبيعية والتوجان (بروز رأس الجنين) وحتى الولادة. ويسمح بالتصوير بالفيديو أثناء المخاض وبعد ولادة الطفل، إلا أننا لا نسمح بالتصوير أثناء مرحلة التوجان (بروز رأس الطفل) ولا نسمح به أيضاً أثناء بقية مرحلة الولادة.

لا يسمح بالتصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو في حالة الولادة القيسارية، لأسباب تتعلق بسلامة المرضى/الرضع. بعد ولادة الطفل وفحصه بواسطة الفريق الطبي، فإنه يسمح بالتصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو.



المقارنة بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية

تم ولادة معظم الأطفال من الرحم، عبر عنق الرحم والرحم. وهذا يتحقق في حالة كان عنق الرحم متسع بالكامل وكانت الألم تدفع بالطفل للخارج بمساعدة الانقباضات عبر قناة الولادة. وهذا ما يسمى بالولادة الطبيعية (المهبلية). أحياناً يحتاج الأطفال إلى مساعدة بأدوات خاصة كي يولدوا بهذه الطريقة.

أما الولادة القيصرية فهي تكون عندما تم ولادة الطفل في غرفة العمليات من خلال شق بطن الأم. تقرر بعض النساء إجراء ولادة قيصرية لأسباب محددة (مثل: وضع الجنين الخاطئ في الرحم، وجود توأم، مشاكل صحية تعاني منها الأم، عدوى الهربس، إلخ). وفي معظم الحالات، سوف نسعى إلى مساعدتك على الولادة الطبيعية (المهبلية). إلا أن هناك بعض الحالات والتي قد تشكل الولادة الطبيعية خطراً عليك وعلى طفلك، وفي هذه الحالات سوف يقوم فريق الولادة بالاستفادة من خبراتهم في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء عملية قيصرية. قد تظهر بعض المؤشرات على وجوب إجراء عملية قيصرية مثل: النزيف أو عدم وجود الطفل في قناة الولادة بشكل مناسب أو في حالة تعرّض ولادة الطفل.

معظم النساء اللواتي يلدن ولادة طبيعية يبقين تحت ملاحظتنا لمدة تصل إلى 48 ساعة بعد الولادة. ويمكن تمديد هذه المدة إذا ظهرت أي مضاعفات. أما بالنسبة للنساء اللواتي أجرين عملية قيصرية فسوف يبقين للاستشفاء في المستشفى لمدة 4 أيام إذا لم تظهر أي مضاعفات تتطلب تمديد مدة الاستشفاء.

الرضاعة الطبيعية

إننا نعتبر أن الرضاعة الطبيعية هي الخيار الأفضل لكل من الأم والطفل. ليس فقط لأن الرضاعة الطبيعية هي خيار غذائي صحي، بل أيضا لأن الدراسات أظهرت أن هناك فوائد صحية لكل من الأم والطفل.

يعتبر حليب الأم الخيار الأكثر فائدة من الناحية الغذائية لطفلك حيث أنه يحتوي على كل المواد الغذائية والأجسام المضادة اللازمة للطفل، والتي تساعد الطفل على مكافحة العدوى. كما أن الأطفال الذين يرضعون طبيعيا هم أقل عرضة للحساسية ومشاكل التنفس (الربو). وأظهرت الدراسات أن حليب الأم يعمل على تحسين نمو الدماغ للأطفال وهو أقل عرضة للأمراض التي من الممكن أن تصيبها في حياتهم (السكري وسمنة الأطفال).

كما أن الأمهات أيضا يستفدن من الرضاعة الطبيعية. فبالإضافة إلى الترابط مع الطفل والمساعدة في فقدان الوزن المكتسب خلال فترة الحمل، فقد أظهرت الدراسات أن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن طبيعيا هن أقل عرضة للإصابة بمرض السكري وبعض أنواع مرض السرطان وفقدان كثافة العظام.

توصي منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية لمدة سنة واحدة، حيث تعتبر أي كمية من حليب الأم مفيدة لك ولطفلك. قد يبدو هذا لبعض الأمهات أنها مدة طويلة يجب الالتزام بها، خصوصا للأمهات التي ينبغي عليهم العودة لأعمالهن. إلا أنه وبمجرد البدء بالرضاعة الطبيعية، فإن العديد من النساء يجدن أن استعمال معدات ضخ حليب الثدي مناسب جدا لجدولهن الزمني كما أن معظم برامج التأمين الصحي الآن تغطي تكاليف مضخة الثدي!

يرجى الاتصال بمسؤول التأمين الخاص بك للحصول على التفاصيل الدقيقة بناء على الخطة الخاصة بك.

بما أن الرضاعة الطبيعية تعتبر خيارا رائعا، إلا أن تعلمها ليس دائما بالسهل. لذا يرجى طرح ما تريدين من أسئلة أو زيارة العيادة أو زيارة مجموعات الرضاعة الطبيعية الأخرى للحصول على المشورة والدعم والتعليم.

إننا نقدم دورات تعليمية تدور حول الرضاعة الطبيعية بعد الولادة:
صباح الثلاثاء 10-12 (مستشار الرضاعة التعاوني) صباح الخميس 12 (مع دعم الداية)

الموقع: 8 شارع كاميليا، كامبريدج. ادخلـي مباشرةً من مدخل مستشفى CHA كامبريدج، الباب المجاور لمركز الولادة في CHA كامبريدج.

الموارد الأخرى:

www.Kellymom.com

www.zipmilk.org

برنامج ماساتشوستس ل營زية (الأم والرضاع والأطفال) - (800) 1007-942
منظمة La Leche - (800) LA LECH

مجلس الأمهات المرضعات - (617) 244-5102

تحالف ماساتشوستس للرضاعة الطبيعية - www.massbfc.org

الرابطة الدولية للخبراء الاستشاريين في الرضاعة - www.ilca.org

مركز المعلومات الصحية للنساء - (800) 994-9662

اكتئاب ما بعد الولادة

تعاني معظم الأمهات من بعض التكيف العاطفي بعد الولادة. وأحياناً يطلق عليه اسم كآبة ما بعد الولادة أو اكتئاب ما بعد الولادة. ويمكن أن يشتمل على مشاعر مثل: الشعور بالحزن أو الخوف أو الغضب أو نوبات البكاء. بالنسبة لمعظم النساء فإن هذه الأعراض تكون خفيفة وتحتفى في غضون أسبوع أو أسبوعين. إلا أن بعض النساء يعاني من شكل أكثر حدة، يسمى اكتئاب ما بعد الولادة.

ويمكن لاكتئاب ما بعد الولادة أن يستمر لبضعة أيام أو حتى أسبوع بعد الولادة. وحيث التغير في الهرمونات هو ما يلعب دوراً رئيسياً في ذلك، إلا أن السبب الرئيسي الكامل لاكتئاب ما بعد الولادة ما يزال غير معروف تماماً.

يعتبر اكتئاب ما بعد الولاد حالة طبيعية، والتي كثيراً ما تؤثر على نوعية الحياة ويمكن علاجها بالكامل. يرجى تذكر أن اكتئاب ما بعد الولادة هو ليس مجرد عيب في الشخصية أو شيء موجود فقط في رأسك. كما أنه ليس بالشيء الذي يمكن التحكم به أو الشيء الذي يمكن علاجه بمفرده.

تشمل العوامل التي تزيد من خطر إصابتك باكتئاب ما بعد الولادة التالية:

- المعاناة السابقة من الاكتئاب، سواء كان ما بعد الولادة أو غير ذلك (حيث أن أكثر من نصف الأمهات الجدد لم يعاني من مسبقاً من الاكتئاب)
- التاريخ العائلي للاكتئاب، وخصوصاً اكتئاب ما بعد الولادة
- الحياة المنزلية أو العلاقات الشخصية المتوترة
- تربية طفل سريع الالهتياج أو طفل يعاني من مشاكل صحية
- الأمية في سن المراهقة أو الشباب

سوف نتحدث معك في العبادة ونعمل على تقييم الأعراض التي تعانين منها، لكن يرجى عدم التردد (أنت أو شريكك) في الاتصال بالعيادة لمناقشة أي مخاوف أو أسئلة قد تكون لديكما.

يرجى الاتصال بنا في الحالات التالية:

- إذا كنت تشعرين بعدم القدرة على رعاية نفسك أو رعاية طفلك
- إذا كنت تشعرين بالإلزام الشديد من الأنشطة اليومية مثل: الأعمال الروتينية أو أعمال النظافة الشخصية
- إذا كنت تشعرين باليأس
- إذا كنت لا تجدين المتعة في القيام بالأنشطة التي كنت تستمتعين بها
- إذا لم يكن لديك شهية أو كنت تقرئين في تناول الطعام

بعض الطرق للتغلب على اكتئاب ما بعد الولادة:

- الأدوية والعلاج
- الدعم الاجتماعي - اطلب المساعدة من الأصدقاء وأفراد الأسرة
- ضعي توقعات واقعية لنفسك - لا تتوقعي القيام بكل الأشياء التي كنت قادرة على القيام بها في الماضي

قد يكون لدى النساء اللواتي يعاني من الفلاق أو الهلوسة الشديدة (سمع أو رؤية أشياء غير حقيقة) أو ضلالات (أفكار ليس لها أساس واقعي) أو تفكير مستمر بالموت أو الضرر لهن أو لغيرهن، حالة مرضية خطيرة تسمى ذهان ما بعد الولادة. وهذه الحالة تتطلب تدخل طبي طارئ. يرجى الذهاب إلى قسم الطوارئ فوراً في مستشفى CHA كامبريدج أو أقرب قسم طوارئ لك.

28-Week Prenatal Care at CHA



CHA Cambridge Birth Center at CHA Cambridge Hospital
1493 Cambridge St.
Cambridge, MA 02139
www.challiance.org/baby